

# ERKENNEN BEEINTRÄCHTIGTER LENKER

**HR Dr. Wilhelm SAURMA**

Landespolizeidirektion Wien  
Ref. A 1.3 Polizeiärztlicher Dienst

## Mögliche Beeinträchtigungen beim Lenken eines KFZ durch

- Alkohol
- Drogen
- Medikamente
- Übermüdung

## Hinweis:

Die ärztliche Untersuchung nach § 8FSG sollte sinnvollerweise **VOR** der ersten Fahrstunde erfolgen.

- Rechtzeitiges Erkennen körperlicher Mängel, die ein Lenken eines KFZ ausschließen
- Dem Führerscheinwerber unnötige Kosten ersparen
- Sicherheit für Fahrlehrer

## Möglichen Auffälligkeiten durch den Konsum beeinträchtigender Substanzen (1)

(Grundlage: Drogenuntersuchungsformulare des amtsärztlichen Dienstes der LPD-Wien)

- **Reaktion** (verzögert, extrem langsam)
- **Körperliche Auffälligkeiten** (Schweißausbruch, Zittern , Unruhe, Injektionsstellen, Erbrechen)
- **Augen** (Bindehäute gerötet, wässrig/glänzend, unruhig)
  - **Pupillen** (verengt, erweitert)
  - **Weite bei seitlicher Beleuchtung** (in Millimeter)
  - **Pupillenreaktion** (sehr träge, fehlend ) bei Sonne, Dämmerung, Dunkelheit oder Straßenbeleuchtung

## Möglichen Auffälligkeiten durch den Konsum beeinträchtigender Substanzen (2)

(Grundlage: Drogenuntersuchungsformulare des amtsärztlichen Dienstes der LPD-Wien)

- **Äußere Erscheinung:** (ungepflegt, verwahrlost)
- **Aussprache/Reden** (lallend, verwaschen, Silben stolpern, ungebremster Rededrang, redselig, Wortwiederholungen, widersprüchliches Reden)
- **Ansprechbarkeit, Orientierung:** (schläfrig, verwirrt, Schwierigkeit Gesprächsthema zu folgen, lässt sich leicht Ablenken)
- **Stimmung, Verhalten:** (aufgeregt, ängstlich unsicher, weinerlich, unangemessen fröhlich, provokativ, verlangsamt, müde, hyperaktiv, aggressiv, ungeschickt, interesselos)

## Möglichen Auffälligkeiten durch den Konsum beeinträchtigender Substanzen (3)

(Grundlage: Drogenuntersuchungsformulare des amtsärztlichen Dienstes der LPD-Wien)

- **Geteilte Aufmerksamkeit** : (gestört: will 2-3 gestellte Aufgaben gleichzeitig durchführen, kann 2-3 gleichzeitig gestellte Aufgaben nicht richtig lösen)
- **Aussteigen aus dem Fahrzeug**: (Gleichgewichtsstörung, Schwierigkeiten beim Gehen, muss sich am Fahrzeug anhalten, Probleme beim Öffnen der Türe)
- **Gang** (schleppend, schwankend, breitbeinig, torkelend, verlangsamt, Bewegungen wie von Impuls gesteuert - nicht fließend , Bewegungen hektisch)

**FAHRTÜCHTIGKEIT**

DIENSTSTELLE / ARZT NAME DES UNTERSUCHTEN / GEB.DATUM

**A. 2. BEOBACHTUNG BEIM ANHALTEN ODER ANTREFFEN**  
Exekutivbeamter vor Ort: Zutreffendes ankreuzen

**Reaktion:** = unauffällig = verzögert = extrem langsam ● 9,0

**Körperliche Auffälligkeiten:** = keine = Schweißausbruch = Zittern = Unruhe = Injektionsstellen = Erbrechen ● 8,5

**Augen:** = unauffällig = Bindehäute gerötet = wässrig/glänzend = unruhig ● 8,0

**Pupillen:** = verengt = erweitert ● 8,0

**Weite:** bei seitlicher Beleuchtung links \_\_\_\_\_ Millimeter rechts \_\_\_\_\_ Millimeter ● 8,0

**Pupillenreaktion:** = prompt = sehr träge = fehlend bei folgenden Lichtverhältnissen: = Sonne = Dämmerung = Dunkelheit = Straßenbeleuchtung ● 7,5

**Äußere Erscheinung:** = gepflegt = ungepflegt = verwahrlost ● 7,0

**Aussprache/Reden:** = deutlich = lallend = verwaschen = Silben stolpern = ungebremster Rededrang = redselig = Wortwiederholungen = widersprüchliches Reden ● 6,5

**Ansprechbarkeit, Orientierung:** = schläfrig = orientiert = verwirrt = Schwierigkeit Gesprächsthema zu folgen = lässt sich leicht Ablenken ● 6,0

**Stimmung, Verhalten:** = ruhig, beherrscht = aufgeregte = ängstlich unsicher = weinerlich = unangemessen fröhlich = provokativ = verlangsamt, müde = hyperaktiv = aggressiv = ungeschickt = interesselos ● 5,5

**Stimmverhalten:** = krampfhaftes Umklammern des Lenkrades = betont lässige Sitzposition = lebhafte, bewegungsreiche Kommunikation mit anderen Fahrzeuginsassen = übermäßige Lautstärke der Musikanlage = anzügliches oder merkwürdiges Gestikulieren = auffälliges Hortieren unterhalb der Sichtlinie = Gegenstände aus dem Fenster werfen ● 5,0

**Geteilte Aufmerksamkeit:** = normal = gestört: = will 2-3 gestellte Aufgaben gleichzeitig durchführen = kann 2-3 gleichzeitig gestellte Aufgaben nicht richtig lösen ● 4,5

**Aussteigen aus dem Fahrzeug:** = normal = Gleichgewichtsstörung = Schwierigkeiten beim Gehen = muss sich am Fahrzeug anhalten = Probleme beim Öffnen der Türe ● 4,0

**Gang:** = sicher = schleppend = schwankend = breitbeinig = torkelnd = verlangsamt = Bewegung wie von Impuls gesteuert (nicht fließend) = Bewegungen hektisch ● 3,5

**Alkoholtest:** = ja, um \_\_\_\_\_ Uhr \_\_\_\_\_ mg/l = abgelehnt = nicht durchführbar ● 3,0

**verdächtige Utensilien:** = Tabletten im Auto = Utensilien: \_\_\_\_\_ ● 2,5

**Verhalten während der Amtshandlung:** = gleichbleibend = wird überaktiv = wird müde ● 2,0

**Medikamenteneinnahme:** = nein = ja Wenn ja, welche \_\_\_\_\_ ● 1,5

**Mohnmehlspeisen in den letzten Tagen:** = nein = ja ● 1,0

Datum \_\_\_\_\_ Uhrzeit \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

## SUBSTANZEN

- ALKOHOL
- CANNABIS
- OPIATE
- COCAIN



- A. Geringe Konzentration
  - Kritikfähigkeit ↓
  - Risikobereitschaft ↑
  - Riskanter aggressiver Fahrstil
  - Aufmerksamkeit ↓
  - Konzentration ↓
- B. Steigende höhere Konzentration
  - Optische Wahrnehmungsstörung
- C. Hohe Konzentration
  - Grob Feinmotorik ↓
  - Fehleinschätzung von Abstand und Entfernung
  - Fahrfehler ↑ „wie Anfänger“

Verkehrsrelevante Wirkungen (Typische Fahrfehler):

*Sedierung, starke Müdigkeit, Störung der Motorik*

- Wechselnde Fahrgeschwindigkeit
- Langzeit THC-Konsum → langsames Fahren
- Abweichen (Abdriften) von der Fahrspur mit anschließender Lenkkorrektur
- Zu spätes Reagieren (besonders + Alkohol)

Verkehrsrelevante Wirkungen (Typische Fahrfehler):

*Verzerrte Wahrnehmung, unklare Grenze zwischen Wahrnehmung und Realität bis zu 48 Stunden nach Konsum*

- Gestörte Distanzabschätzung (durch erweiterte und verzögernd reagierenden Pupillen)
- Erhöhte Blendeffekte bei Nachtfahrten durch die erweiterten und verzögernd reagierenden Pupillen
- Charakteristische unerklärliche Auffahrunfälle
- Unwesentliches wird überdimensional – das Bremslicht wird z.B. als untergehende Sonne interpretiert und nicht erkannt

## Verkehrsrelevante Wirkungen:

- Denkfähigkeit sowohl unter akutem als auch unter chronischem Opiateinfluss nicht gegeben
- Entzugssyndrom – nicht fahrfähig – Störung der Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsfähigkeit
- Denken und Handlungsweise eingeeengt auf das Bedürfnis nach Drogenkonsum

Verkehrsrelevante Wirkungen:

*Unter Ausweich- und Substitutionsmittel:*

- Zentrale Dämpfung, Sedierung: reduzierte geistige Aktivität,
- verlangsamte Motorik
- verlängerte Reaktionszeit
- Schläfrigkeit, Apathie
- Gleichgültigkeit gegenüber Außen- reizen
- Extreme Pupillenverengung (Miosis) ohne Dunkeladaptation: Sehschwäche bei Dunkelheit
- Motivationsverlust
- Wesensveränderung

## Verkehrsrelevante Wirkungen:

- Steigerung der motorischen Fähigkeiten
- Subjektives Gefühl der Leistungssteigerung bei objektiver Leistungseinbuße und verminderter Selbstkritikfähigkeit
- Nachlassende Konzentration bei Ideenflucht
- Verminderte Aufmerksamkeit
- Reizbarkeit und Aggressivität
- Erweiterte Pupillen ohne Helladaptation – Blendungsmöglichkeit
- Während depressiven Stadiums: Fahrunfähigkeit, Einengung der Aufmerksamkeits- und Wahrnehmungsfähigkeit, bedrängende Entzugssymptomatik



# VERDACHTSGEWINNUNG DURCH DIE EXEKUTIVE



- Schleudern
- beinahe Zusammenstoßen mit Gegenständen
- knappes Vorbeifahren am Gegenverkehr und an geparkten Fahrzeugen
- Fahren auf gesperrten Straßen
- Fahren ohne Licht
- auffällig langsames oder auffällig schnelles Fahren
- abruptes Beschleunigen oder Anhalten
- zu dichtes Auffahren
- falsches Betätigen des Blinkers



- abruptes oder verkehrswidriges Abbiegen
- Fahren im Gegenverkehr oder kreuzenden Verkehr
- Anhalten an ungeeigneten Stellen
- grundloses Anhalten auf der Fahrbahn
  
- Trinken im Fahrzeug
- Hantieren unter der Sichtlinie
- Gegenstand aus dem Fenster werfen
- Schließen des Aschenbechers
- Herunterkrepeln der Ärmel

- Aussteigen aus dem Fahrzeug
- Gang
- Suchen nach Asservaten
- Alkoholgeruch
- Alkotest/Alkomat
  
- stark verzögert, extrem langsame Reaktion, ist als außerhalb des Normrahmens zu bewerten



- Ständiges Nase-Hochziehen, wie bei Schnupfen
- Auffällig verengte oder erweiterte Pupillen
- Verlangsamte Lichtreaktion
- Sprache verwaschen, Silbenstolpern, lallend
- Fluchen, Schimpfwörter
- Orientierungsstörung – weiß Person ihren Namen, weiß sie Tag, Monat, Zeit, Jahr und wo sie ist ?
- Ansprechbarkeit, Grad der Wachheit
- Schläfrig, leicht aufweckbar, schlafend



### *Geteilte Aufmerksamkeit*

- = Fähigkeit, sich auf mehrere Dinge gleichzeitig zu konzentrieren, ist gestört (Lenkrad, Blinker, Gaspedal, Verkehr, Radio)
- fährt wie Anfänger → fehlende Leistungsreserven, besonders bei Schlechtwetter → Unfallgefahr
- Fragen nach zwei oder mehr Sachen schafft er nicht zu lösen

### *Motorik*

- Beim Aussteigen unsicherer Gang
- Stehen auf einem Bein unsicher



<i>Drogenart</i>	<i>Pupillengröße</i>	<i>Pupillenreaktion</i>
<i>Halluzinogen</i>	<i>erweitert</i>	<i>fast normal</i>
<i>Designerdrogen , Cocain</i>	<i>erweitert</i>	<i>verlangsamt</i>

*Drogenutensilien bei Haschisch und Marihuana:*

- Joints
- Hasch-Zigaretten
- Long Papers, „King Size“-Papier
- zusammengerollte Papierstreifen
- Filterdips
- Rolls (Papier für Zigarette),
- Stanniolpapier, angeschwärzt, zum Hineinbröseln des Haschisch
- Plastiktüten mit Haschischdruck
- Zerrissene Zigarettschachteln
- Aufkleber „Hardrock-Cafe“, „Coffee-Shop“, „Keine Nacht ohne Drogen“



# DROGENSTOFFKLASSEN

*Zentral erregende Stoffe;  
Psychostimulanzien, Amphetamine, Amphetaminabkömmlinge,  
Designer-Drogen, Kokain*

*Symptome nach Wirkungsverlust der Psychostimulanzien*

- Dysphorie
- Verstimmung
- Schlaflosigkeit
- Reizbarkeit, Aggressivität
- subjektiv sich angegriffen fühlen (körperlich und verbal)  
übersteigerte Reaktionen
- Situationsverkennung durch Kritikverlust
- Panik, Angst, Panikattacken
- Verfolgungswahn



*Zentral erregende Stoffe;*

*Psychostimulanzien, Amphetamine, Amphetaminabkömmlinge,  
Designer-Drogen, Kokain*

- psychische Erregung
- schwitzen (Angstschweiß)
- Harndrang (Wasserlassen erschwert)
- Hautgefäße enggestellt (Blut für Skelettmuskulatur, Herz und Gehirn nötig)
- Gefühl wie „Frieren“ (Gänsehaut)

*Zentral erregende Stoffe;*

*Psychostimulanzien, Amphetamine, Amphetaminabkömmlinge,  
Designer-Drogen, Kokain*

*Wirkung abhängig von:*

- Drogendosis
- Verabreichungsart
- Persönlichkeit des Individuums
- Umgebung der Verabreichung

*Zentral erregende Stoffe;*

*Psychostimulanzen, Amphetamine, Amphetaminabkömmlinge, Designer-Drogen, Kokain*

*Wirkung:*

- Wachsamkeit
- subjektiv Konzentration
- Omnipotenzgefühl (ich kann alles)
- gesteigerte Aktivität
- Fallweise euphorische Stimmung

*typisch:*

- Rededrang
- oft Geschwätzigkeit
- Rastlosigkeit

*Zentral dämpfende Stoffe*  
*Opiate - Wirkungen*

- körperliche und geistige Aktivität
- Muskeler schlaffung
- Pupillenreaktion verlangsamt
- „Schlafzimmerblick“ – durch hängende Augenlider
- Myosis (Stecknadelkopfpupille)

## Drogen - Übersichtsraster

	Cannabis	Benzo Barbiturate	XTC Cocain	Opiate	PCP	Hallu- zino- Gene	Schnüffel- stoffe	Alkohol
Pulsrate	↑	↓	↑	↓	↑	↑	↑	↑
RR	↑	↓	↑	↓	↑	↑	↑↓	↑↓⊥
Temperatur	⊥	⊥	↑	↓	↑	↑	↑↓⊥	⊥
Muskeltonus	↓	↓	↑	↓			↓	↓
Reflexe	↓	↓	⊥↑	↓			↓	↓
Gehen	<b>breitbeinig</b>	wie betrunken	<b>sicher</b>	<b>unsicher</b>	Mondgang	Gestörte Motorik	vverlangsamt	verlangsamt
Sprache	<b>Inkompletter</b> Gedanken- Gang	breite undeutliche Aussprache	<b>Redselig</b>	<b>verlang- samt</b> kratzend	Wortwieder- holungen, inkomplette, verzögerte Antworten Sprech- schwierig- keiten	Verwirrt desorientiert	Undeutliche Aussprache	



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**